

Overtallige biggen

Verleggen – alternerend zuigen -
pleegzeugen

Bert Driessen (KHK-Geel)
Luc Martens (PVL-Bocholt)
Jos Van Thielen (KHK-Geel)

Wanneer spreken we over “overtallige biggen”?

- op zeugniveau
 - verleggen naar andere zeug
 - alternerend zuigen
 - creëren van een pleegzeug
- op productiegroepniveau
 - opvang in een apart hok (‘nursery’) of in een couveuse (‘rescue deck’, piggy saver, ...)

Verleggen

- Doel
 - Uniformiseren van toomgrootten
 - Biggen van gelijke grootte en gewicht
- Continu of gelimiteerd?
 - continu
 - Stress door speenrangorde
 - Ziekte druk
 - gelimiteerd verleggen



Verleggen

- Welke en wanneer
 - Zwaarste biggen verleggen
 - Na eerste levensdag, eerst biestopname
- Naar welke zeug? Afhankelijk van:
 - Conditie
 - Voorgeschiedenis
 - Aantal biggen die de zeug reeds heeft
 - Aantal functionele spenen

Verleggen

- Nadelen
 - Lager speengewicht → zwaarste biggen verleggen
 - Ziekteoverdracht tussen tomen vergroot → verleggen tot 2 tomen beperken



Alternerend zuigen

- Doel
 - Alternerend biggen door de zeug laten zogen, al mogelijk vanaf de geboorte
 - Concurrentie tussen toomgenoten aan de uier verminderen
- Meestal
 - Zwakste en lichtste biggen continu bij zeug
 - Grootste biggen enkele uren afzonderen
 - Eventueel oxytocine om zwakke biggen te helpen bij zuigen



Pleegzeugen

- Pleegzeug:
 - (meestal) 3 w geleden geworpen → 1 stap
 - kan ook in 2 stappen
 - nu gespeend
- Eigenschappen
 - Goede moedereigenschappen
 - Goede melkgift
 - Goede conditie



Pleegzeugen

- Pleegzeug:
 - Verhuist naar kraamafdeling waar zeugen nu werpen
 - Krijgt de worp met de beste biggen
- Tijdstip verleggen
 - Na biestopname, na 24u tot 48u



Pleegzeugen

- Opletten voor:
 - Doodliggen
 - Daarom rustig karakter van zeug belangrijk
- Voeropname zeug
 - Beperken
 - Remmen melkgift
 - Uier goed leeg gedronken

