

Het Varkensloket
Scheldeweg 68
9090 Melle
09 272 26 67
info@varkensloket.be



Vraag:

Hebben jullie informatie omtrent de reden (naast de genetica) van aanwezigheid van dopspenen bij zeugen?

Antwoord:

Het voorkomen van dopspenen is een aangeboren afwijking, die erfelijk is (erfelijkheidsgraad $\pm 0,20$). Bij de geboorte is het moeilijk om het voorkomen met zekerheid vast te stellen. De afwijking is beter zichtbaar bij gelten, maar kan pas na de eerste worp worden bevestigd omdat deze spenen meestal geen melk geven.

Gedurende de opfok kunnen tepels beschadigd geraken, dit zijn evenwel geen dopspenen. Om de beschadiging van tepels te vermijden wordt bij pasgeboren biggen, die later mogelijk als opfokgelt zullen worden ingezet, aangeraden om de tepels tijdens de zoogperiode ter hoogte van de borstkas af te plakken om beschadigingen (o.a. door de stalvloer) te vermijden. Vooral de voorste tepels moeten worden beschermd, omdat deze later de grootste melkproductie geven.

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.