

Vraag:

Ik heb een vraag betreffende dikke oortjes. Waar komen die dikke oortjes vandaan, een deel wordt dik rond het oormerk en van anderen worden ze aan de andere kant dik.

Wat kunnen we eraan doen? Soms groeit het oormerk er volledig in, maar je merkt een grote achterstand bij het biggetje, zodoende nijpen we het oormerk er nu uit. Kan er daar een probleem van gemaakt worden bij een eventuele controle van het voedselagentschap?

Antwoord:

De oorzaak van een bloedor is een beschadiging van de bloedvaten van de oorspiieren, waarna een bloeding ontstaat tussen het oorkraakbeen en de (fascie van de) oorspiieren¹. Vechten, oorbijten, schuren of krachtig schudden met de kop, vastpakken van de biggen aan de oren en tatoeëren kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van bloedoren. Uit een recente studie² blijkt dat bij geormerkte oren het risico op het voorkomen van een bloedor wordt verhoogd (1,6%) vergeleken met oren zonder oormerk (0,6%). Bloedoren bleken ook meer voor te komen bij biggen van oudere zeugen (2,45%) in vergelijking met biggen van eersteworps zeugen (0,97%). Waarschijnlijk is er sprake van een erfelijke factor aangezien het bij sommige rassen meer voorkomt.

Binnen de drie weken worden de bloedstolsels in het oor geresorbeerd, waarna een schrompel- of bloemkooloor overblijft. Het is niet aangewezen om in tussentijd een bloedor in te snijden. Langs deze snede kunnen bacteriën (o.a. *S. aureus*, *S. hyicus*, *E. coli*)⁴ het oor binnendringen, wat kan leiden tot een etterige ontsteking van het oor of een bloedvergiftiging. Dit kan ook voorkomen als in het oor wordt gebeten.

Indien het bloedor groot is, is het mogelijk dat het varken de kop scheef gaat houden en/of niet voldoende voeder kan opnemen. Enkel indien het varken gehinderd wordt, kan het oor worden ingesneden. Vanaf de oorpunt wordt een snede van enkele cm gemaakt, waarna het bloed eruit wordt gedrukt. Indien er sprake is van sterk bloedverlies kunnen biggen last krijgen van bloedarmoede, waardoor een ijzerinjectie is aan te raden.

Vanaf het spenen dient elk varken gemerkt te worden met een oormerk van het geboortebeslag. Bij controles gebruikt het FAVV checklists om na te gaan of wordt voldaan aan de vastgelegde criteria.

In de checklist '[Identificatie en registratie](#)' worden voor de identificatie volgende onderdelen met betrekking tot oormerken opgenomen:

- Het aantal of het percentage van de gespeende varkens zonder oormerk.
- Geen aanwezigheid van varkens met oormerken die verplaatst, veranderd, gewijzigd of vervalst zijn. Het aantal niet-conforme dieren wordt genoteerd. (10 punten)

¹ Handboek varkensziekten, 1987. Karl-Otto Eich. Uitgeverij Terra.

² Van den Hof J., Beek J., Chiers K., Maes D. Risk factors for auricular hematomas in pigs. Poster presentation IPVVS Belgian Branch studiedag Klimaatregeling ter preventie van aërogene transmissie van pathogenen, 27 november 2013.

- Geen aanwezigheid van nooit geïdentificeerde varkens (na speenleeftijd), met het aantal niet conforme dieren. Het aantal niet-conforme dieren wordt genoteerd. (3 punten)
- Geen aanwezigheid van varkens die afkomstig zijn uit een ander bedrijf dan waar ze geboren zijn, zonder oormerk van het herkomstbedrijf. Het aantal niet-conforme dieren wordt genoteerd. (1 punt)
- Geen aanwijzingen van varkens die 48 u na invoer nog niet voorzien waren van een Belgisch oormerk. Het aantal niet-conforme dieren wordt genoteerd. (1 punt)

In de checklist, vindt u naast de kolommen 'C' (conform) en 'NC' (niet-conform) de kolom 'punten' waarbij telkens een wegingsfactor (1, 3 of 10) vermeld wordt (zoals hierboven weergegeven). Hoe groter dit cijfer, hoe ernstiger de niet-conformiteit wordt beschouwd. Een controle waarbij geen enkele niet-conformiteit wordt vastgesteld of alleen niet-conformiteiten met een gewicht 1 wordt als 'gunstig' geëvalueerd. Ook bij een niet-conformiteit van gewicht 3 kan nog steeds een 'gunstig' rapport worden verkregen op voorwaarde dat het aantal niet-conformiteiten minder is dan 20%. In alle andere gevallen is de evaluatie 'ongunstig', maar een PV wordt pas opgesteld bij een niet-conformiteit van een gewicht 10 en meer dan 20% niet-conformiteiten. De normale gevolgen bij het vaststellen van niet-conformiteiten zijn een waarschuwing, een proces-verbaal en inbeslagname. In het kader van de controle van de randvoorwaarden GLB (MTR)-premies, moeten alle niet-conformiteiten worden doorgegeven. Elke niet-conformiteit kan gevolgen hebben en leiden tot een (tijdelijk) verlies van een deel van de premie.

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.